

Nieuwsbrief Kliniek Voortplanting Gezelschapsdieren

Editie September-Oktober 2015

De teef die niet meer loops wordt

Wanneer een teef lange tijd niet meer loops gezien is, wordt eerst onderzocht of er een onderliggende medische oorzaak kan gevonden worden. Wanneer dit niet het geval is, kan de loopsheid geïnduceerd worden. Recent hebben wij met succes een nieuwe methode toegepast om nog een nestje te krijgen bij een teef die niet meer loops werd.



- Een Suprelorin® implantaat wordt ter hoogte van de navel ingebracht onder de huid van de teef.
- De teef zal binnen enkele dagen tekenen van loopsheid vertonen waarna de cyclus via vaginale cytologie en progesteronbepaling dient opgevolgd te worden.

- Op het correcte tijdstip wordt het implantaat via een kleine incisie verwijderd, de teef hoeft slechts onder lichte sedatie.
- De teef kan nu drachtig worden via natuurlijke dekking of inseminatie.



De dekking was succesvol, de teef was drachtig.



Zeven gezonde puppy's!



Is jouw teef al lang niet meer loops geworden, neem dan contact op met ons via het nummer 09/264 75 64 of 0471/ 98 35 82 om de mogelijkheden te bespreken.

REPRO-team:

Drs. Eline Wydooghe - Drs. Féline Snoeck - Prof. Dr. Ann Van Soom

